

اختلال دو قطبی نوعی اختلال خلقی است. ویژگی اصلی آن بی ثباتی در عملکردهای هیجانی و خلق است. تفاوت وضعیت خلقی افراد مبتلا به اختلال دو قطبی با افرادی که خلق طبیعی دارند این است که خلق و خو، روحیه و انرژی آنها دچار نوسان های شدید می شود یعنی بیش از حد شاد، تحریک پذیر و پرخاشگریا بیش از حد غمگین و خسته و بی حوصله می شوند و این حالت ها را در مدت طولانی تری تجربه می کنند حالت اول را که همراه با شادی یا پرخاشگری شدید است، مانیا (شیدایی) و حالت دوم را که با غمگینی همراه است، افسردگی می گویند.

**افراد مبتلا به اختلال دو قطبی ممکن است به طور متناوب مرحله مانیا یا افسردگی را تجربه کنند.**

از هر ۱۰۰ نفر جمعیت عمومی دو تا سه نفر به اختلال دو قطبی مبتلا می شوند. که این آمار با تعداد مبتلایان به دیابت برابر است .

### علائم خلق بالا:

شادی زیاد،عصبانیت زیاد،پرخاشگری ، پر حرفی ، کاهش نیاز به خواب، ولخرجی، افزایش انرژی به طوریکه ساعتها فعالیت می کنند بدون اینکه نیاز به استراحت داشته باشند،افزایش اعتمادبه نفس(مانند

: من از دیگران زیباتر هستم، من قدرت زیادی دارم ) ، افزایش نامتناسب فعالیت های مذهبی ، اشکال در قضاوت و تصمیم گیری و .....

### علائم خلق پایین :

غمگینی واندوه ، از دست دادن علاقه به فعالیت های معمول روزانه، اشکال در خواب (اشکال در به خواب رفتن در هنگام شب و احساس خستگی پس از بیدارشدن از خواب، پر خوابی یا خواب آلودگی در طول روز ) ، عدم رسیدگی به بهداشت شخصی ، زود خسته شدن ، احساس گناه ، انزوا و گوشه گیری و کاهش ارتباطات اجتماعی، احساس پوچی و بی ارزشی ، تغییر (کاهش یا افزایش) فکر کردن درباره مرگ و خودکشی و یا اقدام به خودکشی و .....

همه افرادی که به اختلال دو قطبی مبتلا می شوند همه علامت های فاز مانیا و افسردگی را تجربه نمی کنند هر کس ترکیب متفاوتی از این علامت ها را تجربه می کند.



### علت اختلال دو قطبی

دو عامل اساسی در ابتلا به اختلال دو قطبی مانند بسیاری دیگر از بیماری های دو قطبی نقش دارند:

✚ آسیب پذیری عبارت است از داشتن استعداد برای ابتلا به اختلال دو قطبی. یعنی برخی از افراد بیش از سایر افراد آمادگی ابتلا به این بیماری را دارند.

✚ استرس عبارت است از هر موقعیت جدیدی که در زندگی ما رخ می دهد استرس ها می توانند منفی (مرگ عزیزان) یا مثبت (ازدواج) باشند. واکنش همه افراد به انواع استرس ها یکسان نیست.

**آسیب پذیری فرد را مستعد بیماری می کند و استرس ها**

**نیز شروع بیماری را تسهیل می نمایند.**

### درمان اختلال دو قطبی

درمان اختلال دو قطبی شامل درمان دارویی و مداخلات غیر دارویی است . درمان مناسب با نظر روانپزشک انتخاب می شود . به دلیل ماهیت برگشت پذیر و عودکننده این اختلال معمولا درمان آن طولانی و دارای مراحل است . کامل نمودن دوره درمانی ، احتمال عود بعدی اختلال را به حداقل می رساند.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی  
مرکز آموزشی و درمانی رازی ارومیه



## اختلال دو قطبی چیست؟

لطفا در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن  
۰۴۴۳۲۷۲۲۹۳۳ سوپر وایزر آموزش به بیمار مرکز  
رازی تماس حاصل فرمایید.

سوپروایزر آموزش سلامت

از جمله این درمان ها می توان به مشاوره ، روان  
درمانی فردی ، آموزش خانواده و آموزش بیمار اشاره  
کرد.



## سیر درمان

اختلال دوقطبی یک اختلال عود کننده  
وهمراه با دوره های بهبودی است . برخی  
بیماران به سرعت وبا مداخلات درمانی خفیف  
بهبود می یابند. برخی دیگر ممکن است به  
درمانهای جدی تر و حمایت بیشتری  
نیاز داشته باشند. معمولا با مصرف دارو علائم  
بیماری به سرعت کاهش می یابددر صورت  
کامل شدن دوره درمان ، احتمال عود بعدی  
کاهش می یابدو درصورت عود ، شدت علائم  
خفیف تر خواهد بود.

منبع : طباطبایی ، مریم (۱۳۹۲). راهنمای آموزش  
بیمار ، اختلال خلقی دوقطبی ، تهران : نشر گیسو  
آدرس : ارومیه-۶کیلومتری جاده سلماس-جنب جهاد  
کشاورزی-بیمارستان رازی

## درمان دارویی

درمان اصلی درمان دارویی می باشدو برای تثبیت  
وضعیت خلق نظیرلیتیم کربنات ، والپروات سدیم ،  
کاربامازپین و ... استفاده می شود.

داروها علاوه برمزایای درمانی ممکن است عوارضی  
هم داشته باشد که این عوارض همیشه و درتمامی  
افراد ظاهر نمی شوندو اگر هم بروزپیداکنند همیشه  
خطرناک و جدی نیستند. روانپزشک زمانی داروها را  
تجویز می کند که منافع آنها بسیار بیشتر از  
عوارضشان باشد. چنانچه باعوارض دارو مواجه شدید  
در اولین فرصت با روانپزشک خود مشورت کنید.  
بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی  
به قطع دارو نیست .

## درمان غیر دارویی

دارو نقش مهمی را در کم کردن علائم  
بیماری ، کوتاه نمودن دوره بیماری  
وجلوگیری از حملات بعدی دارد. این نوع از  
درمان ها به تنهایی وبدون دارو درمانی اثر  
بخش نیست بلکه باید همزمان با مصرف  
داروها برای بهبود عملکرد وسازگاری بیمار و  
خانواده با بیماری به کار می رود.