



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
آذربایجان غربی
مرکز آموزشی و درمانی رازی ارومیه



قرص لیتموم

لطفا در صورت نیاز به راهنمایی با شماره
تلفن ۰۴۴۳۲۷۲۲۹۳۳ سوپر وایزر آموزش به
بیمار مرکز رازی تماس حاصل فرمایید.
سوپروایزر آموزش سلامت

۶- در صورتیکه نوزاد شیر خوار دارید
از شیر دهی در دوران مصرف لیتموم
اجتناب کنید.

۷- استفاده از ایمن دارو در دوران
حاملگی ممنوع است.

۸- در صورتیکه مصرف لیتموم را
فراموش کردید بلافاصله مصرف کنید
اما اگر زمان نوبت بعدی فرا رسیده از
مصرف آن (دو برابر کردن دوز) دارو
خودداری کنید.

۹- هر ۳ ماه یکبار سطح خونی لیتموم
به همراه عملکرد کلیوی و عملکرد
تیروئید با دستور پزشک معالج کنترل
شود.

منبع: کتاب اطلاعات دارویی (دکتر حاج بابایی)

آدرس: ارومیه- ۶ کیلومتری جاده سلماس- جنب
جهاد کشاورزی

۴- در صورتی که هر کدام از
علائم زیر را مشاهده کردید
مصرف لیتموم را قطع کرده
و فوراً "با پزشک تماس
بگیرید.

- تهوع
- استفراغ
- اسهال
- سرگیجه
- تغییر سطح هوشیاری
- عدم تعادل
- لرزش شدید
- تاری دید
- اختلال در تکلم

۵- عملکرد کلیه و تیروئید
بیمار باید هر ۶-۱۲ ماه با
دستور پزشک معالج کنترل

معرفی دارو:

داروی لیتیوم جزء گروه تثبیت کننده روحیه است که در بیماریهای اعصاب و روان کاربرد دارد و باعث جلوگیری از عود علائم می شود.

عوارض جانبی این دارو کدامند؟

لرزش در دستها وانگشتان - عدم تعادل - اختلال تکلم - افزایش فعالیت حرکتی - تهوع - استفراغ - کاهش اشتها - اسهال - خشکی دهان - تشنگی و احساس طعم فلز در دهان - وزوز گوش - کاهش دید - کمی فشارخون - کاهش ضربان قلب - تغییرات قابل برگشت در نوار قلبی - افزایش ادرار - قند در ادرار

بی اختیاری ادراری - مسمومیت کلیه جوش - خارش - کاهش حس - خشک و نازک شدن موها افزایش قند خون گذرا - گواتر - کم کاری تیروئید - تورم - افزایش وزن

آیا موقع استفاده از این قرص از سایر داروها بطور خود سرانه استفاده کنیم؟

۱- از آنجایی که مصرف هم زمان داروها با این دارو باعث تغییرات سطح خونی لیتیوم می شود بنابراین پزشک خود را از مصرف سایر داروها مطلع کنید.

۲- مصرف هر گونه دارو در زمان استفاده از این دارو باید با اطلاع پزشک معالج باشد.

چه مواردی را باید موقع مصرف این دارو مد نظر قرار دهیم؟

از نظر بروز علائم تورم - یا افزایش ناگهانی وزن بدن باید تحت مراقبت باشید.

۲- برای جبران از دست دادن آب و املاح از طریق عرق و اسهال طولانی بایستی رژیم غذایی متعادل با مایعات و نمک کافی مصرف کنید.

۳- برای کاهش تحریکات گوارشی ، لیتیوم را باید بعد از غذا و همراه مقدار زیادی آب یا شیر مصرف کنید.